

Sobre vacinas



Tomei uma injeção no local de distribuição em massa; para o que era?

Se você tomou uma injeção, você tomou uma vacina. A vacina é dada para evitar que você

pegue uma doença determinada.

Por que tomei uma vacina?

Você tomou uma vacina porque foi, ou pode ter sido, exposto a algo que pode fazer com que fique muito doente. Esta vacina o ajudará a evitar que adoença.

O local da injeção está um pouco vermelho e inchado. Isso é normal?

O local onde você tomou a injeção pode ficar vermelho, inchado ou dolorido. Isso é normal. Se a área estiver muito inchada, se houver linhas vermelhas ao longo do seu braço, ou se você se sentir febril, entre em contato imediatamente com o seu médico ou com o departamento local de saúde.

Perguntas?



Talvez você tenha perguntas sobre o remédio que tomou. Para obter mais informações, telefone para o departamento local de saúde ou visite estes websites:

**Connecticut Department of Public Health
(Departamento de Saúde Pública de Connecticut)**

<http://www.ct.gov/dph>

**Centers for Disease Control and Prevention
(Centros de Controle e Prevenção de Doenças)**

<http://emergency.cdc.gov/preparedness/>




410 Capitol Avenue
Hartford, CT 06134-0308

Phone: 860-509-8000
www.ct.gov/dph

Estado de Connecticut



Distribuição em massa
Após o ponto de distribuição:
O que faço em seguida?



Tel: 860-509-8000
www.ct.gov/dph

Por que tenho que tomar isso?



Você pode ter recebido uma injeção (vacina) ou medicamento para levar para casa (antibiótico ou antiviral). O medicamento lhe foi dado para evitar que adoça ou para fazer com que se sinta melhor.

Se você recebeu medicamento para levar para casa, é importante tomá-lo **EXATAMENTE** conforme as instruções na embalagem. Você receberá um folheto contendo “Informações ao paciente”, que esclarece o tipo de medicamento que está tomando. Mantenha o folheto de “Informações ao paciente” em local seguro, pois ele contém informações importantes. Se perder esse folheto, ou se precisar dele em um outro idioma, entre em contato com o departamento de saúde local ou estadual para receber outra cópia.

Ouçá os noticiários locais para obter informações sobre a emergência e qualquer outra coisa que precise fazer.

Sobre antibióticos e antivirais

I Recebi medicamento para levar para casa. Que tipo de medicamento é?

Se recebeu medicamento para levar para casa, pode ser que tenha recebido um antibiótico ou antiviral. Pode ser um comprimido ou um líquido. O antibiótico age ajudando o seu corpo a combater bactérias que podem fazer com que fique doente. O antiviral age ajudando o seu corpo a combater um vírus que poderia fazer com que fique doente. Eles podem ser usados para fazer com que você se sinta melhor ou para evitar que adoça.

Como devo tomá-lo?



O folheto de “Informações ao paciente” que você recebeu informa como tomar o medicamento. Para que o medicamento tenha efeito, é preciso tomá-lo **EXATAMENTE** como descrito na embalagem do medicamento. É importante tomar o medicamento nos horários certos e não pular nenhuma dose. Se não tomar o medicamento do modo descrito, você poderá ficar muito doente. Certifique-se de manter este medicamento em local seguro, fora do alcance de crianças.

Estou me sentindo melhor, posso para de tomar o medicamento?

É muito importante terminar de tomar todo o medicamento que recebeu, mesmo se estiver se sentindo bem. Não diminua a dose nem pare de tomar o medicamento sem antes falar com o seu médico ou departamento local de saúde, para ter certeza se é tudo bem. Se não terminar de tomar todo o medicamento, ele não terá efeito ou você poderá ficar muito doente.

E quanto aos efeitos colaterais?

O folheto de “Informações ao paciente” contém os efeitos colaterais que se pode ter ao tomar este medicamento. Se você tiver algum dos efeitos colaterais sérios que constam no folheto “Informações ao paciente”, telefone para o seu médico ou local departamento de saúde imediatamente.

O comprimido é grande demais para mim e difícil de engolir. Posso esmagá-lo ou cortá-lo ao meio?

Dependendo do tipo de medicamento que recebeu, talvez não seja possível esmagá-lo ou cortá-lo ao meio. Pode ser que não tenha efeito se for esmagado ou partido ao meio. Telefone para o seu médico ou departamento local de saúde para saber como fazer para facilitar a ingestão do medicamento ou para ver se pode obtê-lo em forma líquida.